

**LYSABION***Suspensión oral***Pienso complementario dietético**

Objetivo de nutricional específico: Reducción del riesgo de la cetosis y la convalecencia de la cetosis en vacas lecheras y ovejas.

Composición por ml:

Propano - 1,2- diol (precursor de la glucosa) 720 mg
Levaduras desecadas 167 mg

Aditivos:

Propionato sódico (E-281) 50 mg
Oligoelementos o compuestos de oligoelementos
Cobalto (sulfato cobaltoso, heptahidratado)(E-3) 50 mg

Constituyentes analíticos:

Proteína bruta	2,5%
Fibra bruta	0,5%
Aceites y grasas brutos	0,05%
Ceniza bruta	4%
Sodio	1,17%
Humedad	86%

Indicaciones de uso:

Vacas lecheras y ovejas: Reducción del riesgo de cetosis y recuperación de la cetosis.

Posología y modo de administración:Dosificación:*Vacas lecheras:*

Reducción del riesgo de la cetosis: 125 ml/día durante 8 días.

Convalecencia de la cetosis: 250 ml de 1 a 2 veces al día durante 4 a 8 días.

Ovejas:

Reducción del riesgo de la cetosis: 25 mg/día durante 5 días.

Convalecencia de la cetosis: 50 ml de 1 a 2 veces al día durante 3 a 5 días.

Administración: Oral.

Se recomienda usar el producto entre las 6 semanas previas al parto y las 3 semanas después del mismo.

Se recomienda usar Lysabion con ayuda de una pistola dosificadora.

Agitar bien antes de su uso.

Presentación:

Garrafa de 5 L.

Fabricante: FR-22 327 06

Distribuido por:

Bayer Hispania, S.L.
Av. Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Nº Registro: ESP08600130